

Знаци и симптоми узимања стимуланса

Кокаин: изразита еуфорија, убрзан говор, покрети и срчани ритам, широке зенице, потреба за кретањем, осећај моћи и самопоуздања, склоност ка насилничком понашању

Амфетамини и клубске дроге: појачано узбуђење, скок телесне температуре, убрзано дисање, претерано знојење и губитак течности, смањена потреба за сном

Последице: срчани удар, шлог, конвулзије, мишићни грчеви, апатија, деперсија, параноидна психоза

Нове психоактивне супстанце продају се као соли за купање или средства за прехрану биља. Изазивају еуфорију и убрзан рад срца, користе се орално и ушмркавањем.

Последице: конвулзије, хематоми на екстремитетима, бол у грудима, пад телесне температуре, поремећај упамћивања, депресивност

У чему је проблем са екстазијем?

доводи до прегревања тела, губи се велика количина течности


Последице: срчани или мождани удар, мишићни грчеви, кома

Зашто млади узимају супстанце

- ◆ Радозналост
- ◆ Потреба да се експериментише са личним искуством
- ◆ Утицај вршњака
- ◆ Покушај да се разреши усамљеност или проблем
- ◆ Досада
- ◆ Жеља за променом и новим видовима задовољстава
- ◆ Уверење да је то у тренду
- ◆ Трауме и/или злостављање у детињству

Коме да се обратите

Специјална болница за болести зависности
Теодора Драјзера 44, Београд
Тел: 0113671429
Факс: 0113671431
Е-маил: zavodzbz@eunet.rs
www.drajzerova.org.rs



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Црвени крст Србије
Red Cross of Serbia

✉ **Нова порука:**

Сви мислимо да се лоше ствари дешавају само другима....

На коришћење супстанци помислите ако учите....

- ◆ Нагле и неочекиване промене понашања и расположења
- ◆ Занемаривање својих обавеза, хобија али и досадашњих пријатеља и/или емотивних партнера
- ◆ Изостајање из школе и са факултета, избегавање радних обавеза и лоше оцене
- ◆ Избегавње казни и одговорности за своје поступке
- ◆ Манипулативност, свадљивост и непријатељство према члановима породице
- ◆ Вербална и физичка агресија према ближњима
- ◆ Запуштање спољног изгледа и личне хигијене
- ◆ Убодни трагови на кожи и тенденција да се одећом дугих рукава они прикрију
- ◆ Сливен, неразговетан говор, губитак у тежини
- ◆ Повлачење, ленчарење, незаинтересованост
- ◆ Нестанак новца, драгоцености и скупих личних или породичних предмета, позајмљивање новца
- ◆ Поседовање скупих телефона, одеће или новца
- ◆ без адекватног образложења о начину зараде
- ◆ Промена друштва и блиских пријатеља
- ◆ Прибор за конзумирање илегалних супстанци (шприцеви, кашичице, цевчице за инхалирање)

Знаци и симптоми узимања марихуане

Стакласт поглед, црвенило очију и раширене зенице, гласан говор и смех, појачана осетљивост за боје, мирисе, укусе, осећај успореног протицања времена, поспаност
Последице: губитак мотивације и интересовања, отежана концентрација као и учење и запамћивање, психотичне епизоде, оштећење плућа, имуног и репродуктивног система



Синтетички канабиноиди – продају се као препарати на биљној бази, често путем интернета, који се махом конзумирају у форми цигарета, миришљавих штапића као алтернатива марихуани.
Могу да изазову психотична стања, инфаркте срца, поремећај рада бубрега, конвулзије

Коефицијент интелигенције код особа које су почеле са узимањем канабиса као тинејџери смањује се за 8 поена у узрасту од 13-38 година и никада се не опоравља, чак и ако се прекине са узимањем супстанце!

Знаци и симптоми узимања хероина и других опијата



- ◆ могућа појава почетне еуфорије /"флеш" - сленг/
- ◆ поспаност и успореност /"кључање" - сленг/
- ◆ бледило лица, хладна кожа, неразговетан, сливен говор, спорији покрети и рефлекси,
- ◆ успорен рад срца и снижен крвни притисак
- ◆ уске зенице

Последице:

настанак апстиненцијалног синдрома при наглој обустави супстанце повећање толеранце на опијате након учесталог узимања супстанце оштећења јетре, зуба и десни инфекције коже, поткожног ткива и крвних судова, запаљења, апцеси и едем плућа, срчане инфекције, инфективна обољења ХИВ и ХЦВ инфекција, СИДА, предозирањем, смрт